


PRECIPITACIÓN ACUMULADA 20/12/04 al 02/01/05



COMENTARIO

Durante las últimas dos semanas las lluvias se han recostado sobre el oeste de la región pampeana, con máximos fácilmente identificables sobre el norte de CB y sudoeste bonaerense. En un rápido resumen se puede decir que las lluvias sobre la mayor parte de ER y el este bonaerense (por debajo del estuario del Río de la Plata) han sido escasas o incluso nulas, afianzando un patrón pluviométrico deficitario.

La última lluvia generalizada se registró entre el jueves 23 y el viernes 24, provocada por el último frente que logró desplegar su actividad sobre gran parte de la región pampeana que, sin embargo, no alcanzó el norte del país. Posteriormente se dieron algunas lluvias dispersas en la noche del martes 28 sobre CB y ER. Entre la noche del 31 y la tarde noche del domingo 2, también se sucedieron precipitaciones sobre el sur bonaerense, sectores de LP y CB. Estos últimos eventos responden a sistemas precipitantes generados a partir de inestabilidades de escala local, que no tienen una cobertura homogénea. Por lo general la nubosidad que descarga estas precipitaciones se desarrolla rápidamente y es común que estos eventos duren pocas horas y tengan una distribución espacial heterogénea. Esto se distingue claramente de las lluvias frontales, donde la cobertura nubosa tiene un despliegue más extendido y una oferta de agua más generalizada.

Las escasas o nulas precipitaciones sobre el este de la región pampeana, ha impactado fundamentalmente en el este de BA. Si bien se observa un significativo retroceso de las reservas en el este entrerriano, el aumento del área con problemas de sequía sobre la provincia de BA es el saldo más destacado de esta falta de lluvias.

Sobre el sudeste bonaerense esta situación ha favorecido la cosecha de trigo, pero pone en riesgo las sementeras con girasol y genera un magro escenario para la implantación de soja de segunda. La implantación de esta oleaginosa del centro para el este de BA, queda sujeta a una evolución muy exigida, atendiendo que las perspectivas para la recuperación deseada del perfil de humedad no es muy probable.


El mapa de reservas se realiza simulando sobre el terreno una pradera permanente, cuyo requerimiento hídrico puede diferir bastante del de un cultivo determinado. En particular el maíz y el girasol se encuentran en etapas fenológicas comparables a la demanda de una pradera, mientras que la soja de primera al presentar una exigencia menor, puede leerse corrida un nivel de humedad hacia arriba.

Se podría decir que la campaña gruesa evoluciona satisfactoriamente sobre la mayor parte de CB, SF, el oeste entrerriano, el norte y sudoeste de BA.

Entre la noche de hoy (miércoles 5) y el sábado, se esperan lluvias principalmente sobre la provincia de BA, que pierden eficiencia sobre el este.

Sobre CB, SF y ER, las lluvias tenderán a ser localizadas, a partir de tormentas que se desarrollan dentro del aire tropical. En estas provincias no se espera un cambio significativo de temperatura hasta entrada la semana próxima.

ESTADO DE LAS RESERVAS al 03/01/05



METODO FORTE LAY - AIELLO

Cualquier comentario sobre los mapas será bienvenido y pueden enviarlo a: bucefalus@ciudad.com.ar