




Consultora de Climatología Aplicada
e-mail: cca@ciudad.com.ar - tel/fax: 4722 1251 y 4487 2507

UN ESCENARIO POSIBLE 16/01/07

Ciertas similitudes de la actual campaña con la de hace 20 años atrás, perfilan indicadores que constituyen antecedentes favorables para el cierre de este ciclo.

LA MÁS PARECIDA


En el informe de la semana pasada hacíamos mención de que allá por el mes de setiembre, cuando el fenómeno de El Niño comenzaba a afianzarse, la evolución a futuro de este episodio, se acoplaba con muchas semejanzas al comportamiento observado durante la campaña 86/87. Dado que en el último trimestre de 2006, las precipitaciones tuvieron un despliegue que mostró muchas similitudes al de aquella campaña, es interesante observar como se comportaron las lluvias en el primer trimestre del 87. Esto permitiría allanar la búsqueda de un indicador que puede dar señales mas claras de la posible distribución de las lluvias en este período de definición de la cosecha de granos gruesos.



Recurriendo a la estadística, el IRI publica habitualmente la marcha actual de los apartamientos de la temperatura superficial del mar y las compara con años en que la situación resultaba similar. La marcha actual se destaca con la línea azul y ha ido acompañando en forma ajustada la performance del año 86/87. Teniendo en cuenta este dato que surge de la comparación estadística, es razonable observar que sucedió con las precipitaciones en el primer trimestre del año 87. Recordamos que lo que se

esta tratando de encontrar es un indicador que permita predecir corrimientos positivos o negativos de la precipitación a lo largo del próximo trimestre. El pronóstico de corto plazo no es influenciado por estas circunstancias y queda bien definido por las habituales emisiones hechas por CCA u otras fuentes. Se trata de proyectar dentro de lo posible, si el actual buen paso que lleva la campaña gruesa sobre la franja central, tiene posibilidades de sostenerse.

Observemos la configuración que arroja el mapa de categorías de lluvias del primer trimestre del año 87.



En principio se destacan importantes precipitaciones sobre el sur de CB y el noroeste de BA. También el sur de SF y gran parte del centro norte de BA, superaron las lluvias normales de este período. Sobre el resto de la zona núcleo no se encuentran sectores que muestren deficiencias pluviales. Esta distribución de las precipitaciones no quiere decir que no se hayan observado pulsos secos temporarios, tal como sucede actualmente en la mayor parte de la región pampeana.

El sur de BA tuvo un aporte de lluvias poco satisfactorio durante aquel trimestre. Una oferta de agua similar en la actual campaña sobre el sur de la región implicaría mantener el paso complicado que muestra actualmente la zona. Por otra parte si el patrón pluvial se comporta en forma semejante al del 87, la adecuada disponibilidad de humedad se mantendría. La eventual sobreabundancia de agua durante este trimestre puede generar problemas temporarios a cosecha, sin embargo no definirían anegamientos sostenidos. Cabe recordar que actualmente las napas freáticas están muy bajas en todo el sur de CB y el noroeste de BA, por lo cual el riesgo de que se produzcan inundaciones es muy bajo.