

SAN LUIS: Primera estimación de producción en una campaña marcada por la sequía

Informe N° 227– 2° quincena de mayo 2020

Soja. Se estima una producción de 137.800 tn en un área sembrada de 210.100 ha, con un rinde promedio de 8 qq/ha, valor más bajo de la última década. En los últimos días de mayo se completó la trilla de los lotes, habiéndose perdido el 19% equivalente a 39.200 ha.

Maíz. Se estima una superficie sembrada de 391.900 ha, de las cuales un 29% se destinarían a consumo animal. En los lotes destinados a grano el promedio de rendimientos sería de 32 qq/ha (-41% vs. Promedio de la década), lo que se traduce en una producción de 755.300 tn. A fines de mayo el avance de cosecha era del 32%.

Contexto climático. Las lluvias del trimestre marzo, abril y mayo fueron considerablemente inferiores al promedio histórico, lo que tuvo un doble efecto, aumentando las mermas de los cultivos invernales y provocando que el agua útil en suelo sea limitada para la siembra de invernales. Para los próximos días no se prevén precipitaciones.



SOJA

A finales del mes de mayo se concluyó con la cosecha de la soja 19/20 de San Luis, en la cual la superficie sembrada de 210.100 ha fue similar a la campaña previa, aunque se estima una producción de 137.800 tn, valor 68% inferior a la campaña 18/19. Esta disminución se da principalmente por los bajos rendimientos obtenidos y por la superficie que se ha perdido a causa de la sequía, estimada en 19%, ya que muchos productores optaron por no cosechar. Las causas de estas pérdidas son múltiples, entre los que se encuentran varios eventos de granizo, sequía en gran parte del ciclo y altas temperaturas durante el llenado, una combinación que resultó irremediable.

El rendimiento promedio para la provincia se ubicó en 8 qq/ha lo que implica una reducción del 64% respecto a la campaña previa y del 66% respecto al promedio histórico de la década (Fuente Min. Agr.), siendo este el valor más bajo de toda la serie. Sumado a los bajos rindes, la calidad del grano obtenido ha sido en general mala, dañados por hongos, verdes y con bajo poder germinativo.

SOJA CAMPAÑA 2019/20*	
Área sembrada	210.100 ha**
Área cosechable	170.900 ha
Rendimiento	8 qq/ha
Producción	137.800 tn

*Valores provisorios a la 2da quincena de Mayo 2020.

**Fuente: Ministerio de Agroindustria

Fuente: Departamento de Información Agronómica - BCCBA



MAÍZ

Hasta el momento se estima un avance de cosecha del 32% de los lotes, pero la trilla está siendo condicionada por la capacidad de cosecha, que se encuentra limitada por la poca disponibilidad de maquinaria que hay en la provincia. Ante el cierre de los límites provinciales impuesto por el gobierno local y las limitaciones existentes, muchos contratistas y sus máquinas están encontrando dificultades para ingresar al territorio puntano.

Habiendo un 29% del maíz sembrado con destino de consumo animal, y habiéndose perdido un 15% debido a los problemas climáticos de la campaña, el área cosechable para grano se estima en 236.500 ha. En esta superficie el promedio de rendimiento en seco es de 32 qq/ha (-41% vs. promedio de la década según Min. Agr) mientras que bajo riego el promedio se ubica en 70 qq/ha, lo que en suma equivale a una producción total 755.300 tn. En general los rendimientos de los maíces vienen siendo por debajo del promedio histórico de la década en un 66%, ya que se inició con poca agua en suelo y luego durante el ciclo del cultivo las precipitaciones fueron muy escasas, lo que también se conjugó con altas temperaturas durante el llenado de grano y que provocaron que se corte este periodo, adelantándose la madurez.

MAÍZ CAMPAÑA 2019/20*	
Área sembrada	391.900 ha**
Área cosechable	236.500 ha
Rendimiento	32 qq/ha
Producción	755.300 tn

*Valores provisorios a la 2da quincena de Mayo 2020.

**Fuente: Ministerio de Agroindustria

Fuente: Departamento de Información Agronómica - BCCBA




CONTEXTO CLIMÁTICO

El estudio de precipitaciones realizado mediante estimaciones satelitales indica que, el acumulado de lluvias para el trimestre marzo, abril, mayo fue inferior respecto al promedio histórico (2015-2020) para todos los departamentos de la provincia, lo que condicionó

fuertemente los rendimientos antes mencionados. A su vez, en el mes de mayo prácticamente no hubo lluvias, cuando lo normal es que lluevan al menos 25 mm.


Precipitaciones marzo, abril y mayo en San Luis: 2020 vs. Histórico (2015-20)




Fuente: Departamento de Información Agronómica a partir de datos del satélite GPM.

A su vez, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que no habrá lluvias en la provincia de San Luis al menos para las próximas dos semanas, mientras que la temperatura media estará entre los 8° y 12°.

Pronóstico de precipitación acumulada (mm) del 02-Jun-2020 a las 9 hs al 08-Jun-2020 a las 9 hs




Pronóstico de temperatura media (°C) del 01-Jun-2020 al 07-Jun-2020



Fuente: SMN.

De cara a la siembra de cultivos invernales, estas precipitaciones se reflejan en el suelo, observándose que gran parte del territorio se encuentra en condiciones limitantes de agua en el perfil, a excepción de una porción en el sur de Coronel Pringles y el centro norte de General Pedernera, lo que complicaría la siembra de cultivos invernales.



El presente informe fue desarrollado gracias a la participación de Colaboradores referentes en toda la provincia de San Luis, que aportaron sus datos zonales durante el relevamiento realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba durante la segunda quincena de mayo de 2020.

Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

DIA DPTO. INFORMACIÓN AGRONÓMICA BCCBA

BCCBA
Bolsa de Cereales de Córdoba

CONSULTAS colaboradores@bccba.org.ar | www.bccba.com.ar | 54 351 4229637 - 4253716 Int. 161/158/176