




**BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y
CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA
TRIBUNAL ARBITRAL**

INFORME SALIDA A CAMPO N° 37

20 de Marzo de 2015




D.I.A.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA

Relevamiento de campo en el Departamento Tercero Arriba. 20 de Marzo de 2015.


El presente informe describe la situación de los cultivos estivales de **soja, maní, maíz y sorgo** observados durante el recorrido por el departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba.



Evolución de las precipitaciones

En el siguiente gráfico se presentan las precipitaciones acumuladas, en el departamento Tercero Arriba, registradas durante el período de desarrollo de los cultivos estivales (Septiembre de 2014 hasta el 25 de marzo del corriente año). Dicho período es comparando con el promedio acumulado de las últimas 7 campañas, pudiéndose observar una diferencia de 17%.





Fuente: Sistema de precipitaciones. Bolsa de Cereales de Córdoba.

Situación de los cultivos

En estado general de todos los cultivos relevados es Muy Bueno. En cuanto las etapas fenológicas, la soja se encuentra en estadios reproductivos de R6 a R7, los maíces de segunda en R4, el sorgo en R9 y el cultivo de maní entre R6 y madurez de cosecha.

Se observaron aún lotes afectados por problemas de anegamientos ocasionados por las importantes precipitaciones ocurridas a finales de febrero y principios de marzo.



Foto tomada el 20/03/2015 al norte la localidad de Dalmacio Velez, Dpto. Tercero Arriba. Fuente: BCCBA



Foto tomada el 20/03/2015 al norte de la localidad de Las Perdices, Dpto. Tercero Arriba. Fuente: BCCBA



Evidencias fotográficas del recorrido

Soja. El estado general del cultivo es Muy Bueno. Fenológicamente se encuentra en R6 (Semilla verde de tamaño máximo del nudo). (Fehr y Caviness, 1977).
Se observó la presencia de chinche de los cuernos (*Dichelops furcatus*).

*Foto tomada el 20/03/2015 al norte de la localidad de James Craik, Dpto. Tercero Arriba.
Fuente: BCCBA*



Maní. El cultivo presenta un estado general de Bueno a Regular. El lote se encuentra arrancado.

*Foto tomada el 20/03/2015 al este de la localidad de Carrilobo, Dpto. Tercero Arriba.
Fuente: BCCBA*



Maní. El cultivo se observa en muy buen estado. Se observó presencia de viruela, con incidencia alta.

Foto tomada el 20/03/2015 al norte de la localidad de Las Perdices, Dpto. Tercero Arriba. Fuente: BCCBA



Soja. El estado general del cultivo es Excelente. Fenológicamente se encuentra en comienzo de madurez (R7). (Fehr y Caviness, 1977)
Sin presencia de plagas ni enfermedades.

Foto tomada el 20/03/2015 al sur de la localidad Punta del Agua Dpto. Tercero Arriba
Fuente: BCCBA



Maíz. El cultivo presentaba un estado general muy bueno. Se encuentra en estado de grano pastoso (R4).
Sin presencia de plagas ni enfermedades. (Ritchie y Hanway, 1982)

Foto tomada el 20/03/2015 al sur de la localidad de Villa Ascasubi, Dpto. Tercero Arriba.
Fuente: BCCBA



Maní. El estado general es muy bueno. En cuanto a su fenología, el cultivo se encuentra en R6 (semilla completa- máximo volumen). Se detectó presencia de viruela, con incidencia media.

Foto tomada el 20/03/2015 al norte de la localidad de Tancacha, Dpto. Tercero Arriba.
Fuente: BCCBA



Sorgo. El estado general es muy bueno. Fenológicamente se encuentra en R9 (grano duro). (Vanderlip, 1972) Sin presencia de plagas ni enfermedades. Borduras enmalezadas.

*Foto tomada el 20/03/2015 al norte de la localidad de Pampayasta, Dpto. Tercero Arriba.
Fuente: BCCBA*



Departamento de Información Agroeconómica
Bolsa de Cereales de Córdoba.

